

التهديف (AIDS) هو المرحلة النهائية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV). يحدث عندما يضعف الجهاز المناعي بدرجة كافية بحيث لا يستطيع محاربة العدوى والأمراض. يمكن أن يؤدي HIV إلى AIDS إذا لم يتم علاجه. يمكن اختبار الشخص لمعرفة ما إذا كان مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية. إذا كنت قلقًا بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فراجع طبيبك.

يمكن علاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات. يمكن أن يساعد العلاج في تقليل الحمل الفيروسي، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهديف (AIDS) والعدوى الانتهازية. يمكن للعلاج أيضًا أن يطيل عمر الشخص ويحسن نوعية حياته. يجب تناول الأدوية بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب.

يمكن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عن طريق الدم، السوائل الجسدية، والرضع. يمكن انتقال الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي غير الآمن، مشاركة الإبر، أو انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة. يمكن اختبار الشخص لمعرفة ما إذا كان مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية. إذا كنت قلقًا بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فراجع طبيبك.

يمكن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) عن طريق الدم، السوائل الجسدية، والرضع. يمكن انتقال الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي غير الآمن، مشاركة الإبر، أو انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين أثناء الحمل أو الولادة. يمكن اختبار الشخص لمعرفة ما إذا كان مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية. إذا كنت قلقًا بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فراجع طبيبك.

معلومات عامة عن فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهديف (AIDS)

